

ヤブジラミ (藪虱)

セリ科



草丈は 30~70cm。葉は 2~3 回羽状に裂けて深く切れ込む。オヤビジラミに比べ開花時期が遅い。花期は 5~7 月。

(ヤブジラミ)



果実は枝の先に 4~10 個かたまってつく。花柄が短いので果実はくっつきあう。

オヤブジラミ (雄藪虱) セリ科



草丈は 30~70cm。ヤブジラミよりも葉は細かく羽状に裂ける。花は白色でパラパラとつける。花期は 4~5 月。

(オヤブジラミ)



果実は一か所に 3~6 個つき、花柄は長い。果実が熟すると紫色をおびる。

ミツバ (三葉)

セリ科



草丈は 30~60cm、葉は 3 小葉からなる。日陰に自生し、小さな白色の花をつける。香りが強い。花期は 6~8 月。

オオチドメ (大血止)

セリ科



直径 1.5~3cm の丸い葉をつけ、地面を這うように広がる。葉の周りには切れ込みがある。花は淡緑色で目立たない。花期は 6~9 月。

セリ（芹）

セリ科



草丈は 25～50cm。湿地に自生し、春の七草のひとつ。葉は 3 つに分かれ、花柄の先に白い花をつける。花期は 7～8 月。