

カラスノエンドウ (烏野豌豆) マメ科



つる性で紅紫色の蝶形の花をつける。豆さやは細長く、熟すると黒くなる。生育は旺盛で蔓はよく伸びる。花期は3~6月。

スズメノエンドウ (雀野豌豆) マメ科



つる性で白紫色の蝶形の小さな花をつける。カラスノエンドウに比べると葉はかなり小さい。豆果は2個。花期は3~6月。

カスマグサ (カス間草) マメ科



つる性で、小さな淡青紫色の花を花柄の先に2個つける。少ない。花期は4~5月。

レンゲソウ (蓮華草) マメ科



花柄の先に紅紫色の蝶形の花を輪状につける。やや湿った所に多い。集団で咲くのでよく目立つ。花期は4~6月。

ヤハズソウ (矢はず草) マメ科



淡紅色の小さな蝶型の花を葉のわきにつける。地面を這うように広がる。花期は8~10月。

メドハギ (筮萩) マメ科



草丈は60~100cm。黄白色の蝶形の花で、花弁の一部が紫色の斑となる。茎は直立するが強くない。花期は8~10月。

ミヤコグサ (都草)

マメ科



鮮黄色の蝶形の花をつける。葉は地面を這うように広がり花柄は立ち上がる。それほど多くない。花期は4~10月。

ウマゴヤシ (馬肥し)

マメ科



茎は根元から枝を四方に伸ばし40cmくらいに広がる。花は黄色で、花後に渦巻き形で棘のある果実がつく。花期は4~6月。

コメツブツメクサ (米粒詰草) マメ科



草丈は20~40cm。米粒くらいの黄色の花が球状に集まる。葉は地面を覆い隠すように四方に広がる。花期は5~7月。

クスダマツメクサ (くす玉詰草) マメ科



草丈は20~40cm。コメツブツメクサに似るが、玉状の花房は大きく、淡黄色。少ない。花期は5~7月。

シロツメクサ (白詰草)

マメ科



白色の蝶形の花が球形の塊になる。別名はクローバ。葉は3葉で地面を覆うように広がる。花期は5~8月

ムラサキツメクサ (紫詰草) マメ科



草丈は20~70cm。アカツメクサとも言う。茎は立ち上がり、淡紅色の花をつける。花期は6~8月。

ヌスビトハギ (盗人萩)

マメ科



草丈は 60~120cm。淡紅色の蝶形の花をつけるが、アレチに比べて小さく白っぽく見える。豆莢は 2 節。花期は 8~9 月。

マメ科

アレチヌスビトハギ (荒地盗人萩)



草丈は 50~100cm。淡紅色の蝶形の花をつける。外来種で自転車道沿いに見られる。豆莢は 3~6 節ある。花期は 8~9 月。

ヤブツルアズキ (藪蔓小豆) マメ科



黄色で花の中央に爪形の花弁がある。蔓草で湿地や自転車道沿いに繁茂。花期は 8~9 月。

(ヤブツルアズキ) 科



豆莢は細長く、アズキ型。

ノアズキ (野小豆) マメ科



黄色で花の中央に爪形の花弁がある。ヤブツルアズキに似るが、葉の形が若干異なる。花期は 8~9 月。

(ノアズキ)



豆莢は短くて平たく、エンドウ型。

ヤブマメ (藪豆)

マメ科



紅紫色の蝶形の花をつける。花弁の長さは1.5～2cm。林縁部に生える。葉はダイズ型で幅が広い。花期は9～10月。分布：BC、CY

(ヤブマメ)



豆莢は扁平、莢の縁に沿ってねた毛が並ぶ。種子は通常3個。

ツルマメ (蔓豆)

マメ科



紅紫色の蝶形の花をつけるが、長さは0.5～0.8cm。蔓性で湿地に繁茂している。葉は長楕円形で3複葉。花期は8～9月。

(ツルマメ)



豆莢はやや扁平。莢の全面に黄褐色の毛が密生し、エダマメの小型版。種子は2～4個。

マルバハギ (丸葉萩)

マメ科



草丈は1～2m。草本状の小低木。小葉の先端は丸い。赤紫色の蝶形の花をつぎつぎにつける。花期は8～10月。

コマツナギ (駒繫ぎ)

マメ科



草丈は50～90cm。草本のように見えるが小低木。淡赤紫色の花を穂状につけて咲きあがる。花期は7～9月。

クズ (葛)

マメ科



秋の七草の一つ。紫赤色の蝶形の花をつける。蔓性で生育は非常に旺盛で回りの草花を覆い隠す。花期は7～9月

クララ (眩草)

マメ科



草丈は1 m。葉は羽状複葉でハギに似る。枝先に淡黄色の多数の蝶形花をつける。花期は6～7月。

ネコハギ (猫萩)

マメ科



茎は地を這うように広がる。茎上に3枚の複葉が連なり、葉のつけねに白色の蝶形の花がつく。花期は7～9月。

クサネム (草合歓)

マメ科



草丈は50～80cm。淡黄色の蝶形の花をつける。葉は羽状複葉。湿地に見られるが少ない。花期は7～10月。